

Das Vorkommen eines Zopheriden im palaearctischen Gebiet ist von hohem Interesse. Die nächst verwandten *Nosoderma*-Arten kommen an der Westküste Amerikas, in Mexico und Californien vor, und nur eine Art *obcordatum* Kirby findet sich auf der Ostküste im Norden, in Neu-Schottland, eine weitere *echinatum* Guérin in Cuba und *N. furcatum* Kirsch in Bogota. Die californische *N. diabolicum* Lee. hat in mancher Beziehung Aehnlichkeit mit der Amurensen Art.

Verzeichniß der von Koltze aus den Amurländern eingesandten Staphylinen.

Falagria sulcata Pk. — Bl.¹⁾.

— *fovea* Sharp. — Ch.

Silusa minor Epp. n. sp. — Ch.

Aleochara sanguinea L. — Bl.

— *curta* Sahlb. — Ch.

— *nitida* Grv. — Bl.

Homalota approximans Epp. n. sp.²⁾ — Ch.

— *rudiventris* Fauv. i. l. — Ch.

— *analis* Grv. — Ch.

— *cavifrons* Sharp. — Ch.

— *melanaria* Mannh. — Ch.

— *pygmaea* Grv. — Ch.

— *fungi* Grv. — Bl.

— *orphana* Er. — Bl.

Dasyglossa prospera Er. — Ch., Bl.

Oxypoda ferruginea Er. — Bl.

Tachyporus ruficeps Kr. — Ch., Bl.

— *macropterus* Steph. — Ch., Bl.

— — — var. Abner Sauley — Bl.

Conurus pedicularius Grv. — Ch.

— *humeralis* Epp. n. sp. — Ch.

Mycetoporus additus Epp. n. sp. — Bl.

¹⁾ Bl. = Blagowestschensk. — Ch. = Chabarofka. — Nic. = Nicolajefsk. — PM. = Permskoi-Muleki. — Pr. = Pochrofka. — W. = Wladiwostok.

²⁾ Die Beschreibungen der neuen Arten folgen im nächsten Hefte.

Heterothops nitens Nordm. — Bl.

- *binotata* Grv. — Ch.

Quedius fasciculatus Epp. n. sp. — Nic., Ch.

Creophilus var. *ciliaris* Steph. (*fulvago* Motsch.) — Nic.

Lëistotrophus var. *inauratus* Mannh. — Nic.

Ocyphus fuscatus Grv. — Nic.

Philonthus aeneus Rossi — Nic., Ch.

- *proximus* Kr. — Ch.

- *cephalotes* Grv. — Ch., Nic., PM.

- *sordidus* Grv. — Ch.

- *rotundicollis* Mén. — Pr.

- *varians* Pk. — Nic.

- *albipes* Grv. — Bl.

- *micans* Grv. — PM.

- var. *gilvipes* Er. — Bl.

- *vernalis* Gry. — Ch.

Xantholinus ochraceus Gyll. — Ch.

Leptacinus batychrus Gyll. — Bl.

Cryptobium fracticorne Pk. — Ch.

- *Koltzei* Epp. n. sp. — Ch.

Lathrobium var. *volgense* Hochh. — Ch.

- var. *luteipes* Fauv. — PM.

Domene procera Epp. n. sp. — W.

Sunius melanopygus Epp. n. sp. — Ch.

Paederus littoralis Grv. — PM., Ch.

Stenus humilis Er. — Bl.

- *rugosulus* Fauv. — Ch.

- *clavicornis* Scop. — Ch.

- *amurensis* Epp. n. sp. — Bl.

- *morio* Grv. — Bl.

- *crassus* Steph. — Bl.

- *tarsalis* Ljungb. — PM.

- *conformis* Epp. n. sp. — Ch.

Oxytelus nitidus Grv. — Bl.

- *rugosus* F. — Bl.

Oxyporus var. *angularis* Gebl. — Pr.

Pycnoglypta Heydeni Epp. n. sp. — Ch.

Dr. L. v. Heyden.